

Phlogenzym® mono, Wirkstoff: Bromelain.

Zusammensetzung: Wirkstoff: 1 magensaftresistente Tablette enthält Bromelain 133–178 mg (800 F.I.P.-E.), sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Macrogol 6.000, Triethylcitrat, Vanillin. **Anwendungsgebiete:** Akute Schwellungszustände nach Operationen und Verletzungen, insbesondere der Nase und Nebenhöhlen. **Gegenanzeigen:** Phlogenzym® mono darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Bromelain, Ananas oder einem der sonstigen Bestandteile nicht eingenommen werden. **Anwendungsbeschränkungen:** Bei schweren Blutgerinnungsstörungen (z. B. Hämophilie) oder bei Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Mitteln sollte die Behandlung mit Phlogenzym® mono kritisch abgewogen werden. Auch während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei der Behandlung von Kindern unter 12 Jahren sollte die Gabe von Phlogenzym® mono kritisch abgewogen werden, da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. Bei Lactoseintoleranz sollte Phlogenzym® mono nicht verabreicht werden. **Nebenwirkungen:** Häufig: Magenbeschwerden und Durchfall sowie allergische Reaktionen wie z. B. Hautausschlag oder asthmaähnliche Beschwerden Gelegentlich: harmlose Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe und Geruch. Eine Verminderung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes kann nicht ausgeschlossen werden.



MUCOS Pharma GmbH & Co. KG – D-13509 Berlin

Stand: 05/11