

Gemeinsam machen wir uns stark – für eine gesunde Zukunft.



Wobenzym®
Phlogenzym® mono
Wobe-Mucos®
Wobenzym® immun
Wobenzym® sport
Wobecare™ CBD Aktiv Creme



Wobecare™ CBD Aktiv Creme. Kosmetisches Produkt. Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, SD Alcohol 38-B, Isoamyl Laurate, Glycerin, Aqua (Water), Menthol, Menthyl Lactate, Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Carbomer, Sodium Stearoyl Glutamate, Cannabidiol, Arnica Montana Flower Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Camphor, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Alcohol, Cellulose, Polyglyceryl-3 Stearate, Sodium Hydroxide, Hydrogenated Lecithin, Xanthan Gum, Tocopherol, Caramel, Sodium Phytate, Limonene, Linalool.

Wobenzym® magensaftresistente Tablette
Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei Schwellungen, Entzündungen oder Schmerzen als Folge von Verletzungen; Thrombophlebitis; Entzündung des Urogenitaltraktes; schmerzhafter und aktivierter Arthrose und Weichteilrheumatismus. **Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält als Wirkstoffe: 67,5–76,5 mg Bromelain (eingestellt auf 450 F.I.P.-Einheiten), 32–48 mg Trypsin (eingestellt auf 24 µkat) und 100 mg Rutosid-Trihydrat. **Sonstige Bestandteile:** Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat (pflanzlich), Stearinsäure, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Maltodextrin, Talkum, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Titandioxid (E171), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels oder Ananas; Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren; Schwangerschaft, Stillzeit; gleichzeitige Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen; Blutgerinnungsstörungen wie z.B. Bluterkrankheit; schwere Leber- oder Nierenschäden; unmittelbar anstehende Operation. **Enthält Laktose. Nebenwirkungen:** Selten: Allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Hautrötung, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt verschiedener Art wie Magen-Darm-Krämpfe. Gelegentlich: Asthmaähnliche Beschwerden, Völlegefühl, Flatulenz, Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe, Geruch. Sehr selten: Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, Kopfschmerzen, Blähungen, Hungergefühl. Stand: Juni 2017

Wobenzym® immun magensaftresistente Tablette
Vitamin C, Vitamin D₃, Selen und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E, Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Wobe-Mucos® Ergänzende bilanzierte Diät
Zum Diätmanagement bei onkologischen Patienten während und nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie.

Phlogenzym® mono 800 F.I.P.-Einheiten magensaftresistente Tabletten für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.
Wirkstoff: Bromelain. **Anwendungsgebiete:** Akute Schwellungszustände nach Operationen und Verletzungen, insbesondere der Nase und Nebenhöhlen. **Enthält Laktose.**

Wobenzym® sport
Die Vitamine C, B₂, B₆, B₁₂ und Niacin tragen zur Verminderung von Ermüdung und Müdigkeit und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Frei von Gluten, Laktose, Aroma- und Farbstoffen, vegan.

OPTIFAST®
OPTIFAST® ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung.

OptiFibre®
OptiFibre® ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei gestörter Funktion des Dickdarms zur Nährstoffresorption und -ausscheidung bei Diarrhö (Durchfall) und Obstipation (Verstopfung). Geeignet ab 3 Jahren. Nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.

www.mucos.de
www.wobe-mucos.de
www.wobenzym.de

Sortimentskatalog Informationen für medizinische Fachkreise

Die Systemische Enzymtherapie

Natürlicher Ursprung: Proteolytische Enzyme

Im Rahmen der Systemischen Enzymtherapie werden die natürlichen Enzyme Bromelain und Papain sowie Trypsin und Chymotrypsin eingesetzt. Bromelain und Papain sind pflanzlicher Herkunft: Bromelain wird aus Ananas und Papain aus Papayafrüchten gewonnen. Trypsin und Chymotrypsin sind tierischer Herkunft, sie werden aus dem Pankreas von Schweinen bzw. Rindern isoliert. Alle verwendeten Enzyme werden hoch aufgereinigt und haben Arzneimittelqualität.

In Kombination besser: Wirkpektrum proteolytischer Enzyme

Primär bzw. „klinisch sichtbar“ wirkt die Systemische Enzymtherapie abschwellend, entzündungshemmend und dadurch schmerzlindernd. Zudem kann sie den Blutfluss verbessern. Eine Kombination verschiedener Enzyme ist pharmakologisch und therapeutisch sinnvoll, da die einzelnen Enzyme unterschiedliche Wirkschwerpunkte haben (siehe tabellarische Darstellung).

Die Botenstoffe des Immunsystems: Zytokine

Eine Entzündung ist eine gesunde und notwendige Reaktion des Immunsystems auf potenziell schädliche Reize. An der Steuerung von Ablauf und Dauer entzündlicher Reaktionen sind Zytokine maßgeblich beteiligt. Ihr Einfluss auf Entzündungsprozesse lässt sich in zwei grundsätzliche Wirkungsweisen einteilen: pro-inflammatorische Zytokine fördern die Entzündungsreaktion, anti-inflammatorische Zytokine hemmen die Entzündungsreaktion. Das koordinierte Zusammenspiel pro- und anti-inflammatorischer Zytokine ist die Voraussetzung für den geordneten Ablauf von Entzündungen. Bei einer akuten Immunreaktion überwiegen pro-inflammatorische Zytokine, bei chronisch-entzündlichen Prozessen überwiegen anti-inflammatorisch wirkende Zytokine. Die Wiederherstellung des Gleichgewichts der unterschiedlichen Zytokine im Organismus ist die Voraussetzung, damit eine Immunreaktion wieder zum Ausheilen kommt.


Im Rahmen der Entzündungsregulation kommt proteolytischen Enzymen eine besondere Bedeutung zu, da sie dabei helfen, die Balance zwischen entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Zytokinen wiederherzustellen.

Alles im Gleichgewicht: Zytokinregulierung durch Enzyme

Proteolytische Enzyme sorgen für ein Gleichgewicht der Zytokine. Dieser Prozess erfolgt in 2 Schritten: Nach der Resorption über die Darmschleimhaut binden sich diese Enzyme im Blut an das Molekül Alpha-2-Makroglobulin und überführen es in seine aktive Form. Das aktivierte Alpha-2-Makroglobulin ist nun in der Lage, die überschüssigen Zytokine irreversibel zu binden und die für das Abklingen entzündlicher Reaktionen notwendige Balance wieder herzustellen.

Für einen heilsamen Entzündungsvorgang: Die Systemische Enzymtherapie

Proteolytische Enzyme unterdrücken also nicht die Entzündungsreaktion, sondern unterstützen und beschleunigen vielmehr den geregelten physiologischen Ablauf von Immunabwehr und Entzündungsprozessen, also die Selbstheilungskräfte – bei besserer Verträglichkeit als NSAR. Enzympräparate sind daher insbesondere für die Langzeittherapie geeignet.



Ein Wirkprinzip der Systemischen Enzymtherapie ist also eine dynamische Modulation des Immunsystems, die an die jeweilige Immunlage angepasst ist.

Wirkung	Bromelain	Papain	Trypsin	Chymotrypsin
Entzündungsregulation	+++	++	++	+++
Ödemreduktion	+++	+	++	+
Fibrinolyse/Blutverdünnung	+	–	+++	+++
Regulation Zytokinspiegel	++	++	++	++
Modulation Adhäsionsmoleküle	++	+	+++	++
Reduktion Immunkomplexe	++	+++	–	+

Arzneimittel

Wobenzym®

Endlich mehr Tage ohne Gelenkschmerzen*

* Als Folge von Verletzungen und verschleißbedingten Gelenkentzündungen (aktivierten Arthrosen).



Indikationen	Entzündungshemmendes Arzneimittel (Antiphlogistikum) Angewendet zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei: • Schwellungen, Entzündungen oder Schmerzen als Folge von Verletzungen • oberflächlicher Venenentzündung (Thrombophlebitis) • schmerzhaften und aktivierten Arthrosen (chronischer Gelenkabnutzung) • Weichteilrheumatismus (Erkrankungsbild mit Beschwerden im Bereich von Muskeln, Sehnen, Bändern) • Entzündung des Harn- und Geschlechtstrakts (Urogenitaltrakt)
Darreichungsform	Magensaftresistente Tablette
Zusammensetzung	Kombination pflanzlicher und tierischer Enzyme sowie eines Antioxidans
Wirkstoffe (pro Tablette)	67,5-76,5 mg Bromelain, 32-48 mg Trypsin, 100 mg Rutosid-Trihydrat
Proteolytische Gesamtaktivität	1215 F.I.P.-Einheiten /Tablette (nach Papain-Methode)
Hilfsstoffe	Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat [pflanzlich], Stearinsäure, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Maltodextrin, Talkum, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Titandioxid (E 171), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin
Lactose	etwa 0,15 g/Tablette
Broteinheiten	0,015 BE /Tablette
Dosierung	Tagesdosis 6 – 12 Tabletten, z. B. 2 × 3 oder 2 × 6 Tabletten täglich. Erfahrungsgemäß empfiehlt sich eine Einnahme von 2 × 6 Tabletten täglich in der 1. Woche und 2 × 3 Tabletten täglich ab der 2. Woche. Als Kur über 2 Monate: 2 × 3 Tabletten täglich
Dauer der Anwendung	• Bei akuten Entzündungen bis zum völligen Abklingen der Beschwerden • Bei chronischen / rezidivierenden Erkrankungen nach Ermessen des Therapeuten • Zur Langzeittherapie geeignet • Anwendung ohne ärztlichen Rat nicht länger als 14 Tage
Einnahmemodus	Einnahme unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit, mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit oder 90 Minuten nach einer Mahlzeit 
Gegenanzeigen	• Überempfindlichkeit (Allergie) gegen die Wirkstoffe, Ananas oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels • Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren • Schwangerschaft und Stillzeit • angeborene oder erworbene Blutgerinnungsstörungen wie z. B. Bluterkrankheit • schwere Leber- und/oder Nierenschäden • unmittelbar vor einer Operation • gleichzeitige Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen
Wechselwirkungen	Bei gleichzeitiger Verabreichung mit Antibiotika sind die Plasma- und Urinspiegel von Antibiotika, im Speziellen von Tetracyklinen, Sulfonamiden und Amoxicillin erhöht. Bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen, kann die Hemmung der Blutgerinnung verstärkt werden.
Nebenwirkungen	Gelegentlich: Asthmaähnliche Beschwerden, Völlegefühl, Flatulenz, Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe, Geruch; Selten: Allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Hautrötung, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt verschiedener Art wie Magen-Darm-Krämpfe; Sehr selten: Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, Kopfschmerzen, Blähungen, Hungergefühl.
Weitere Hinweise	Keine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit/Bedienung von Maschinen. Keine ausreichenden Untersuchungen bei Schwangeren, Stillenden und Kindern.
Packungsgrößen	100 Tabl., PZN: 13751831; 200 Tabl., PZN: 13751848; 360 Tabl., PZN: 13751854; 800 Tabl., PZN: 13751860

Arzneimittel

Phlogenzym® mono
Die pflanzliche Enzymtherapie



Keine Lagerung im Kühlschrank notwendig.

Indikationen	Pflanzliches Arzneimittel Angewendet zur Therapie von akuten Schwellungszuständen nach Operationen und Verletzungen, insbesondere der Nase und der Nebenhöhlen
Darreichungsform	Magensaftresistente Tablette
Zusammensetzung	Pflanzliches Enzym
Wirkstoffe (pro Tablette)	133–178 mg Bromelain
Proteolytische Gesamtaktivität nach Bromelain-Methode	800 F.I.P.-Einheiten /Tablette
Hilfsstoffe	Lactose-Monohydrat, Maisstärke, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1 : 1), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin
Lactose	etwa 0,15 g/Tablette
Broteinheiten	0,015 BE/ Tablette
Dosierung	Wenn vom Therapeuten nicht anders verordnet: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 1 x 1 Tablette täglich, maximal 2 x 1 Tablette täglich
Dauer der Anwendung	• Bis zum Abklingen der Schwellungen • Ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8–10 Tage
Einnahmemodus	Einnahme unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit, mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit oder 90 Minuten nach einer Mahlzeit
Gegenanzeigen	• Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff Bromelain, Ananas oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels • angeborene oder erworbene Blutgerinnungsstörungen • gleichzeitige Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen
Wechselwirkungen	Bei gleichzeitiger Verabreichung mit Antibiotika sind die Blut- und Urinspiegel von Antibiotika, z.B. Tetrazyklinen erhöht. Eine Verstärkung der Blutungsneigung bei gleichzeitiger Therapie mit Antikoagulanzen und Thrombozyten-aggregationshemmern ist nicht auszuschließen und bedarf ggf. der Kontrolle.
Nebenwirkungen	Häufig: Magenbeschwerden, Durchfall; allergische Reaktionen, z.B. Hautausschlag oder asthmaähnliche Beschwerden, in diesen Fällen sollte das Arzneimittel unverzüglich abgesetzt werden.
Weitere Hinweise	Keine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit/Bedienung von Maschinen. Keine ausreichenden Untersuchungen bei Schwangeren, Stillenden und Kindern unter 12 Jahren.
Packungsgrößen	20 Tabl., PZN: 5386317; 40 Tabl., PZN: 5386323; 100 Tabl., PZN: 5386346

Ergänzende bilanzierte Diät

Wobe-Mucos®


Zum Diätmanagement während und nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie



Einsatzempfehlung	Zum Diätmanagement von onkologischen Patienten während und nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie
Darreichungsform	Magensaftresistente Tablette
Zusammensetzung	Kombination pflanzlicher und tierischer Enzyme
Inhaltsstoffe (pro 6 Tabletten)	324 mg Papain 348 mg Trypsin 180 mg Chymotrypsin
Proteolytische Gesamtaktivität	mind. 1.500 F.I.P.-Einheiten /Tablette (nach Papain-Methode)
Weitere Inhaltsstoffe	Füllstoff Cellulose; Füllstoff Hydroxypropylcellulose; Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Siliciumdioxid; Cocosöl; Überzugsmittel Natriumalginat, Ethylcellulose und Fettsäuren.
Verzehrempfehlung	Während der Chemo- und/oder Strahlentherapie 3 x 4 Tabletten täglich Nach der Chemo- und/oder Strahlentherapie 3 x 2 Tabletten täglich
Einnahmemodus	Einnahme unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit, mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit oder 90 Minuten nach einer Mahlzeit
Hinweise	Dieses Produkt enthält Stoffe aus der Papaya. Bei Einnahme von Blut verdünnenden Medikamenten oder bei bekannten Blutgerinnungsstörungen sollte der Verzehr mit dem Therapeuten oder Apotheker abgestimmt werden.
Packungsgrößen	120 Tabl., PZN: 11181068; 360 Tabl., PZN: 11181074

Wobenzym® immun

Für eine starke Immunabwehr



Einsatzempfehlung	Zur Unterstützung des Immunsystems und zum Erhalt einer funktionsfähigen Immunabwehr, z. B. • bei unausgewogener Ernährung • in der kalten Jahreszeit • bei Sportlern im Training • bei älteren Menschen • bei Rauchern • in Stresssituationen				
Darreichungsform	Magensaftresistente Tablette				
Zusammensetzung	Enzymkombination mit Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen.				
Inhaltsstoffe	<table><thead><tr><th>pro Tablette</th><th>Tagesportion / 6 Tabletten</th></tr></thead><tbody><tr><td> • Enzyme – 10 mg Bromelain – 45 mg Papain (enthält Sulfite) • Vitamine – 33,3 mg Vitamin C – 5 mg Vitamin E – 1,7 µg Vitamin D₃ • Mineralstoffe / Spurenelemente – 9,2 µg Selen – 1,7 mg Zink • Bioflavonoide – 6 mg Quercetin – 8,3 mg Polyphenole aus Traubenkernen – 66,7 mg 1→3, 1→6 Beta-Glucane (aus Bierhefe) </td><td> • Enzyme – 60 mg Bromelain – 270 mg Papain (enthält Sulfite) • Vitamine – 200 mg Vitamin C – 30 mg Vitamin E – 10 µg Vitamin D₃ • Mineralstoffe / Spurenelemente – 55 µg Selen – 10 mg Zink • Bioflavonoide – 36 mg Quercetin – 50 mg Polyphenole aus Traubenkernen – 400 mg 1→3, 1→6 Beta-Glucane (aus Bierhefe) </td></tr></tbody></table>	pro Tablette	Tagesportion / 6 Tabletten	• Enzyme – 10 mg Bromelain – 45 mg Papain (enthält Sulfite) • Vitamine – 33,3 mg Vitamin C – 5 mg Vitamin E – 1,7 µg Vitamin D₃ • Mineralstoffe / Spurenelemente – 9,2 µg Selen – 1,7 mg Zink • Bioflavonoide – 6 mg Quercetin – 8,3 mg Polyphenole aus Traubenkernen – 66,7 mg 1→3, 1→6 Beta-Glucane (aus Bierhefe)	• Enzyme – 60 mg Bromelain – 270 mg Papain (enthält Sulfite) • Vitamine – 200 mg Vitamin C – 30 mg Vitamin E – 10 µg Vitamin D₃ • Mineralstoffe / Spurenelemente – 55 µg Selen – 10 mg Zink • Bioflavonoide – 36 mg Quercetin – 50 mg Polyphenole aus Traubenkernen – 400 mg 1→3, 1→6 Beta-Glucane (aus Bierhefe)
pro Tablette	Tagesportion / 6 Tabletten				
• Enzyme – 10 mg Bromelain – 45 mg Papain (enthält Sulfite) • Vitamine – 33,3 mg Vitamin C – 5 mg Vitamin E – 1,7 µg Vitamin D₃ • Mineralstoffe / Spurenelemente – 9,2 µg Selen – 1,7 mg Zink • Bioflavonoide – 6 mg Quercetin – 8,3 mg Polyphenole aus Traubenkernen – 66,7 mg 1→3, 1→6 Beta-Glucane (aus Bierhefe)	• Enzyme – 60 mg Bromelain – 270 mg Papain (enthält Sulfite) • Vitamine – 200 mg Vitamin C – 30 mg Vitamin E – 10 µg Vitamin D₃ • Mineralstoffe / Spurenelemente – 55 µg Selen – 10 mg Zink • Bioflavonoide – 36 mg Quercetin – 50 mg Polyphenole aus Traubenkernen – 400 mg 1→3, 1→6 Beta-Glucane (aus Bierhefe)				
Weitere Inhaltsstoffe	Füllstoff Cellulose; Füllstoff Hydroxypropylcellulose; Trennmittel Fettsäuren, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Siliciumdioxid; mittelkettige Triglyceride; Überzugsmittel Natriumalginat, Hydroxypropylmethylcellulose, Ethylcellulose, Polydextrose und Talkum; Maltodextrin; Gelatine; Stärke; Zucker; Farbstoff Titandioxid; Aroma; Natriumselenit				
Fructose	Im Saccharose-Anteil				
Saccharose	1 mg / Tablette				
Verzehrempfehlung	2 x 3 Tabletten täglich				
Verzehrmodus	Einnahme unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit, mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit oder 90 Minuten nach einer Mahlzeit  morgens abends				
Hinweise	Dieses Produkt enthält Stoffe aus Ananas und Papaya. Bei Einnahme von Blut verdünnenden Medikamenten oder bei bekannten Blutgerinnungsstörungen sollte der Verzehr mit dem Therapeuten oder Apotheker abgestimmt werden.				
Packungsgrößen	60 Tabl., PZN: 15421635; 120 Tabl., PZN: 7368631; 240 Tabl., PZN: 7368648				

Wobenzym® sport

Erleichtert den sportlichen Wiedereinstieg
Zur Unterstützung der Regeneration im Sport



Einsatzempfehlung	Zur Unterstützung der Regeneration im Sport, z.B. Für sportliche Wiedereinsteiger • Aus gesundheitlichen Gründen • Trainingseinheiten belasten den Körper stärker als früher Für ambitionierte Freizeitsportler • Trainieren auf ein Ziel hin wie z.B. • Wettkämpfe • Firmenlauf • Wanderurlaub • Skiurlaub, etc.
Darreichungsform	Kapseln
Zusammensetzung	Einzigartige Kombination aus Bromelain*, Vitaminen, Montmorency-Kirsche, Weihrauch und Kurkuma
Inhaltsstoffe	Tagesportion / 2 Kapseln – 360 mg Bromelain* – 480 mg Montmorency-Kirschextrakt – 50 mg Weihrauch-Extrakt – 50 mg Kurkuma-Extrakt – 200 mg Vitamin C – 3,3 mg Vitamin B1 – 4,2 mg Vitamin B2 – 4,3 mg Vitamin B6 – 10 µg Vitamin B12 – 16 mg Niacin – 150 µg Biotin
Weitere Inhaltsstoffe	Füllstoff Hydroxypropylmethylcellulose; Maltodextrin; Trennmittel Siliciumdioxid und Lecithine; Füllstoffe Calciumphosphate und Hydroxypropylcellulose; Verdickungsmittel Pektin.
Verzehrempfehlung	Einnahme unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit, mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit oder mindestens 90 Minuten nach einer Mahlzeit 
Verzehrmodus	2x1 Kapsel täglich (morgens und abends) 4-5 Tage vor Trainingsbeginn mit der Einnahme beginnen Die Ersteinnahme während des Trainings ist ebenso möglich
Hinweise	Dieses Produkt enthält Stoffe aus Ananas Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren
Packungsgrößen	30 Kapseln, PZN 14407030 ; 90 Kapseln, PZN 14407047

*Entsprechend 1.800 F.I.P.-Einheiten

Jetzt mit Wobecare™ CBD Aktiv Creme vom Cannabidiol-Trend profitieren.

CBD –
seine positive Kraft hat eine lange Tradition

Die derzeitige Popularität von Cannabidiol, kurz CBD, liegt sicher an seinen vielen positiven Eigenschaften. Der bekannte Inhaltsstoff aus der Hanfpflanze ist dabei weder rausch- noch suchterzeugend.

Wobenzym®-Experten sehen in dem Inhaltsstoff CBD die ideale Ergänzung zur klassischen Enzym-Therapie. Die besonderen Qualitäten der neuen, wissenschaftlich formulierten Wobecare™ CBD Aktiv Creme sind sofort spürbar.

Wobecare™ CBD Aktiv Creme ist eine einzigartige Mischung aus einem hohen CBD-Gehalt (500 mg pro 100-ml-Tube) und Pflanzeninhaltsstoffen für eine sofortige beruhigende Wirkung und ein kühlendes Gefühl, das der Haut Wohlbefinden und Linderung bringt.

Wobecare™ CBD Aktiv Creme –
auch eine ideale Ergänzung zu Wobenzym®

Während der Enzym-Spezialist Wobenzym® als Arzneimittel nachhaltig die Schmerzursache, die Entzündung, bekämpft und dabei langfristig gut verträglich ist, sorgt das Kosmetikum Wobecare™ CBD Aktiv Creme sofort für ein angenehmes Körpergefühl.

Die Aktiv Creme ist dermatologisch getestet und kann bis zu viermal täglich direkt auf die Haut aufgetragen werden. Wobecare™ CBD Aktiv Creme dringt schnell ein und fettet nicht. Das innovative Produkt, das ohne Tierversuche entwickelt wurde, ist vegan-zertifiziert.



Die einzigartige Kombination aus CBD und ausgesuchten Pflanzenextrakten in einer Formulierung:



Kosmetikum

Wobecare™
CBD Aktiv Creme
Kühlt und entspannt. Für die Haut.

Von Wobenzym®-Experten entwickelt.



Einsatzempfehlung	Kühlender und lindernder Effekt für die Haut Wobecare™ CBD Aktiv Creme ist ein von den Wobenzym®-Experten entwickeltes Kosmetikum und besteht aus einer einzigartigen Kombination ausgesuchter wertvoller Pflanzenextrakte und hoch dosiertem CBD. Wobenzym®-Experten sehen deshalb in der Wobecare™ CBD Aktiv Creme die ideale Ergänzung zur klassischen Enzym-Therapie. Zum Auftragen auf die Haut für eine sofortige beruhigende Wirkung und ein kühlendes Gefühl, das der Haut Wohlbefinden und Linderung bringt. Wobecare™ CBD Aktiv Creme ist vegan und dermatologisch mit „sehr gut“ getestet.
Darreichungsform	Creme / Kosmetikum
Zusammensetzung	Einzigartige Mischung aus Pflanzeninhaltsstoffen wie Arnika, Beinwell und Aloe Vera und einem hohen CBD-Gehalt. Der CBD-Gehalt (500 mg) gilt pro 100 g Tube und nicht pro Einzelanwendung. THC frei (0,0%).
Inhaltsstoffe	Aloe Barbadensis Leaf Juice, Alcohol Denat. (SD Alcohol 38-B), Isoamyl Laurate, Glycerin, Aqua (Water), Menthol, Menthyl Lactate, Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Carbomer, Sodium Stearoyl Glutamate, Cannabidiol, Arnica Montana Flower Extract, Symphytum Ofcinale Root Extract, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Camphor, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Helianthus Annuus (Sunower) Seed Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Alcohol, Cellulose, Polyglyceryl-3 Stearate, Sodium Hydroxide, Hydrogenated Lecithin, Xanthan Gum, Tocopherol, Caramel, Sodium Phytate, Limonene, Linalool.
Anwendungsempfehlung	Creme direkt auf die Haut und die gewünschten Körperbereiche auftragen, einmassieren, bis sie vollständig eingezogen ist. Nach Bedarf bis zu viermal täglich anwenden. Es gibt keine Beschränkung der Verwendungsdauer.
Hinweise	Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf offene Wunden auftragen. Nach Gebrauch die Hände waschen. Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Schwangere oder Stillende empfohlen. Nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet. Enthält Kampfer und Menthol.
Tubengröße	100 ml Creme, PZN: 16818814

Wichtige Fakten zu Wobenzym®


1 NSAR – nur so lange wie nötig

**Wobenzym®
statt NSAR**

- Empfehlen Sie Wobenzym® auch als additive Therapie
- „Nehmen Sie anfangs Wobenzym® zu Ihrem klassischen Schmerzmittel dazu.“
> Dosierungsreduktion der NSAR möglich
- Wobenzym® geht an die Schmerzursache selbst – die Entzündung
- Wobenzym ist in der Standardtherapie (täglich 2 x 3 Tabletten) genauso wirksam wie 150 mg Diclofenac – mit deutlich besserer Verträglichkeit²

**Wobenzym® ist gut verträglich
und nachweislich genauso wirksam¹**

Häufigkeit der Angabe „sehr gut“



2 Wobenzym® – Einnahme und Dosierung

Bei akuten Entzündungen:

Initial täglich 2 x 6 Tabletten für eine Woche,
dann täglich 2 x 3 Tabletten

Bei chronischen Entzündungen:

Empfehlung:
Mindestens 2 monatige **Kur**
Täglich 2 x 3 Tabletten

Dosierungsempfehlung: 2 x 3 Tabletten



**Tipp für
Ihre Kunden:**


Um die Einnahme außerhalb der Mahlzeiten sicherzustellen, empfiehlt sich die Einnahme gleich nach dem Aufstehen und vor dem Zubettgehen.

¹ Wittenborg A. et al.: Vergleichende epidemiologische Studie bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises am Beispiel der Therapie mit nichtsteroidalen Antiphlogistika versus einem oralen Enzymkombinationspräparat. Arzneimittelforschung 2000;50(8): 728-38.

² Ueberall M.A. et al.: Efficacy, tolerability, and safety of an oral enzyme combination vs diclofenac in osteoarthritis of the knee: results of an individual patient-level pooled reanalysis of data from six randomized controlled trials. Journal of Pain Research 2016, Nov 4; 9: 941-961

3 Bedeutende Rolle der Enzyme im Profi-Sport

Unter anderem finden sie Ihren Einsatz im Hochleistungssport der deutschen Fußball-Ligen. Aber auch in vielen weiteren Profi-Sport-Bereichen, wie Handball oder Biathlon. Kein Wunder also, dass wir auch Vanessa Hinz, die mehrfache Biathlon Weltmeisterin, als Markenbotschafterin für Wobenzym® sport gewinnen konnten.



4 Wann welche Empfehlung: Wobenzym® sport oder Wobenzym®

Wobenzym® sport ist die richtige Empfehlung, wenn Ihre Kunden die Regeneration in Trainingsphasen und Wettkampfphasen fördern möchten. Sollte es zu Sportverletzungen kommen, ist das bewährte Produkt Wobenzym® mit seiner entzündungshemmenden Wirkung die richtige Wahl.

Wobenzym® sport:
4 – 5 Tage vor Trainingsbeginn und in der Trainingsphase

- Unterstützung der Regeneration
- Zur Vorbereitung auf eine Trainingsphase und begleitend zum Training

Wobenzym®:
Bei einer Sportverletzung

- Bei Verletzungen wie Zerrung, Verstauchung, Prellung sowie Gelenksbeschwerden