

Phlogenzym® mono 800 F.I.P.-Einheiten, magensaftresistente Tabletten

Qualitative u. quantitative Zusammensetzung. *Wirkstoff:* Bromelain. 1 magensaftres. Tabl. enth. 120-136 mg Bromelain (entspr. 800 F.I.P.–Einh). **Sonst. Bestandt.:** Lactose-Monohydrat, vorverkl. Maisstärke, mikrokrist. Cellulose, Magnesiumstearat (pfl.) (Ph.Eur.), ger. Wasser, hochdisp. Siliciumdioxid, Talkum, Maltodextrin, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.), Natriumlaurylsulfat, Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin. **Anwendungsgebiete:** Pfl. Arzneimittel z. Anw. b. akuten Schwellungszust. n. Operat. u. Verletz., insbes. d. Nase u. Nebenhöhlen. **Gegenanzeigen:** Überempf. geg. Bromelain (Enzym a. d. Ananas), Ananas o. e. d. sonst. Bestandt. Pat. m. Blutgerinnungstör. u. b. Pat., d. Antikoagulanzen o. Thrombozytenaggregationshemmer erhalten. **Nebenwirkungen:** *Häufig:* Diarrhoe, gastrointest. Schmerz., Übelkeit, Erbrechen, allerg. Reakt. wie Pruritus, Erythem, Rötung, Schwellungen i. Gesicht o. Rachen. *Gelegentlich:* Veränder. d. Stuhls i. Beschaffenh., Farbe u. Geruch. **Warnhinweise:** Enth. Lactose. **Inhaber der Zulassung:** MUCOS Pharma GmbH & Co. KG Miraustraße 17 13509 Berlin. **Stand der Information:** 06/2021. **Apothekenpflichtig.**